


## Handläggning av patienter med misstänkt influensa

### Provtagning

- Under säsong är influensa i första hand en klinisk diagnos.
- Patienter som behöver läggas in hanteras utifrån den kliniska bedömningen (hög/låg risk för influensa) och skall gå vidare till avdelning utan att invänta provsvar.
- Influensaprov besvaras inom 4 timmar dygnet runt och kostar ca 1100 kr.

### Var skall patienten vårdas?

- Patienter utan riskfaktorer (hög ålder, underliggande sjukdomar, immunosuppression) som har stabila vitalparametrar behöver sällan läggas in.
- Adekvat övervakning eller medicinsk behandling får aldrig åsidosättas på grund av influensa.
- På vilken avdelning patienter med misstänkt eller bekräftad influensa skall vårdas beror på den aktuella belastningen enligt nedanstående trappstegsmodell.



### Behandling

Dosering till vuxna med normal njurfunktion: T. Tamiflu 75 mg 1 x 2 i 5 dagar

- Bäst effekt om behandlingen inleds inom två dygn efter sjukdomsdebut.
- Influensa som kräver sjukhusvård: generös inställning till behandling även efter 2-4 dygn.
- Svår influensa (tex stort syrgasbehov eller IVA-vård): behandling oavsett sjukdomsduration.

### Postexpositionsprofylax

Dosering till vuxna med normal njurfunktion: T. Tamiflu 75 mg 1 x 1 i 10 dagar

- Medpatienter som samvårdats med smittsam influensapatient.
- Hushållskontakter med riskfaktorer (hög ålder, underliggande sjukdomar, immunosuppression).

### Smittfrihet

Efter ett dygns feberfrihet är patienten smittfri.