

Val av kemiska medel vid städning av smittor på korttidsenhet och särskilt boende

	Regelmässig städning		Slutstädning		Punktdesinfektion vid spill av kroppsvätskor
	Tagytor	-dagligen Golv-egen rutin	Tagytor	Golv	
Vinterkräksjuka (calicivirus)	Virkon 1%*	Normal rengöring	Virkon 1%*	Normal rengöring	Virkon 1%*
Clostridium difficile (CDI)	Incidin** alt. klorinlösning ***	Normal rengöring	Incidin** alt. Klorinlösning ***	Normal rengöring	Incidin** alt. Klorinlösning ***
Influensa	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion
ESBL <u>med</u> riskfaktor	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Ytdesinfektion
MRSA <u>med</u> riskfaktor	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Virkon 1%*	Virkon 1%*	Ytdesinfektion
VRE, ESBL _{carba}	Ytdesinfektion	Normal rengöring	Virkon 1%*	Virkon 1%*	Ytdesinfektion

Förklaringar:

Normal rengöring:

Till golv används moppar som prepareras med rengöringsmedel.

Till övriga ytor används rena, fuktiga mikrofiberdukar. Vid synlig smuts prepareras dessa med rengöringsmedel och vatten.

Moppar/dukar vid smitta:

När särskilda desinfektionsmedel används gäller städdukar och moppar som **inte** är preparerade med rengöringsmedel.

Engångsmaterial är att föredra.

Tagytor:

Ex. säng, sängbord, dörrhandtag, larm, spolknopp, handfat, kranar, duschhandtag, medicinteknisk utrustning och olika hjälpmedel.

Ytdesinfektion

Alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Lämpligt medel är isopropanol ca 45 volymprocent innehållande tensid. Bearbeta ytan mekaniskt. Inverknings tid tills medlet har torkat in.

*Virkonlösning:

En tablett löses i 1 liter vatten i för medlet avsedd flaska. Blandad Virkonlösning är hållbar i **5 dygn**. Inverknings tid **10 minuter**.

** Incidin:

Skumspray på flaska, som är färdig att användas. Ska inte spädas. Hållbarheten är **2 år** från tillverkning oavsett om förpackningen är bruten eller inte. Inverknings tid **3 minuter**.

*** Klorinlösning

En del klorin späds i nio delar vatten. Spädningen är hållbar i **24 timmar**. Inverknings tid **10 minuter**. Synligt smutsiga ytor måste rengöras med rengöringsmedel och vatten innan klorinlösning används.

Flaskor med olika rengöring- och desinfektionsmedel ska desinfekteras på utsidan efter användning liksom använd städutrustning!

Vid frågor kontakta Smittskydd Vårdhygien telefon 010-2425719 smittskydd.vardhygien@rjl.se