

Kirurgisk vård
Operations- och intensivvårdskliniken
Knut Taxbro
Fastställd 2012-08-12
Reviderad 2016-05-23

Bilaga till central venkateter/venport: Actilyse®-behandling vid ocklusion av koagel

Förberedelser:

1. Beställ Actilyse® 2 mg pulver från apoteket.
2. Blanda pulver med **2,2 ml sterilt vatten**
3. Nu har du en koncentration på Actilyse® motsvarande 1mg/ml

Spädning av Actilyse® 1mg/ml:

4. Späd **1 ml** Actilyse® 1mg/ml med **4 ml 0,9 % NaCl**
5. Nu har du en koncentration Actilyse® på **0,2 mg/ml**

Nu är du redo att injicera Actilyse® 0,2mg/ml i den ockluderade katetern:

6. Injicera Actilyse® 0,2mg/ml i CVK/CDK/venport motsvarande katetervolym (oftast mellan 1-5 ml).
7. Vänta i 30 minuter.
8. Försök aspirera ur katetern, går inte detta spola med koksalt.
9. Om du har lyckats öppna katetern är det viktigt att spola genom systemet med 40-60 ml koksalt
10. Om du **inte** har lyckats återställa kateterns funktion upprepa punkt 1-6 och låt Actilyse® 0,2mg/ml-blandningen vila i katetern i upp till ett dygn (diskutera gärna med narkosläkare)

Knut Taxbro

Knut Taxbro
Överläkare
OP-IVA Kliniken
Länssjukhuset Ryhov