

## DYGNSDOSER AV INHALATIONSSTEROIDER (bilaga till Faktadokument astma hos barn) 2017-01-23

Tabell VI. Dygnsdoser av inhalationssteroider till barn (µg).

Barn 0–5 år	Låg dos	Medelhög dos	Hög dos
Budesonid pMDI <sup>1</sup>	200	400	> 400
Budesonid nebuliserat	500	1 000	
Beklometasondipropionat (HFA <sup>2</sup> )	100	200	> 200
Flutikasonpropionat	100	200	> 200
<b>Barn 6–11 år</b>			
Budesonid DPI <sup>3</sup>	200	400	> 400
Budesonid nebuliserat	500	1 000	> 1 000
Beklometasondipropionat HFA	50–100	> 100–200	> 200
Flutikasonpropionat DPI	200	200–400	> 400
Flutikasonpropionat HFA	200	500	> 500
Mometasonfuroat	100	< 400	≥ 400
<b>Barn ≥ 12 år</b>	<b>Se rekommendation för behandling av astma hos vuxna.</b>		

<sup>1</sup>pMDI = *Pressurized Metered Dose Inhaler*, <sup>2</sup>HFA = *hydrofluoroalkan*, <sup>3</sup>DPI = *Dry Powder Inhalers*.