

## Latent tuberkulos - Patientinformation

Tuberkulos smittar från person med lungtuberkulos. Bakterierna sprids genom luften när man hostar eller nyser. Personer i den sjukes närhet andas in bakterierna. Alla personer som utsätts för smitta blir inte infekterade och de flesta som infekteras blir inte sjuka. Alla med tuberkulos är inte smittsamma. Hos de flesta personer kan kroppens försvarskrafter stoppa tillväxten av bakterier. Bakterierna är inte aktiva men finns kvar i kroppen och kan aktiveras senare. Det kallas latent tuberkulos.

Personer med latent tuberkulos:

- är friska
- kan inte sprida tuberkulos till andra personer
- har en reaktion på tuberkulintest (PPD) eller positivt blodprov (tuberkulosantigen)
- kan utveckla sjukdom, aktiv tuberkulos.

Nio av tio personer som har en latent tuberkulos utvecklar aldrig sjukdom, aktiv tuberkulos. Risken är störst för de personer som är nysmittade, det vill säga de som har smittats inom de senaste två åren. Det är också en ökad risk att utveckla sjukdom för barn och ungdomar, en kvinna som genomgått en förlossning under det senaste halvåret och för personer med nedsatt motståndskraft mot tuberkulos på grund av sjukdom eller medicinering. Latent tuberkulos brukar behandlas om personen nyligen är smittad och det inte finns några hinder för att ge medicineringen.

Om man har en latent tuberkulos och drabbas av:

- ✓ **långvarig hosta (mer än tre veckor)**
- ✓ **feber**
- ✓ **nattliga svettningar**
- ✓ **ofrivillig viktnedgång**
- ✓ **lymfkörtelsvullnad på halsen**

ska man ta **kontakt med sin vårdcentral** för att utesluta aktiv tuberkulos.