

Innehållsansvarig:
Sofia Pihl, Överläkare

Godkänd av:
Verksamhetscheferna i sydöstra sjukvårdsregionen

Giltigt fr o m
2019-05-02

Riskklassificering BB

Gemensamma riktlinjer i sydöstra sjukvårdsregionen

Riskklassificering av BB-patienter ska göras av BM, (v.b. i samråd med ansvarig läkare) då pat förs över från förlossningen till BB samt stämmas av dagligen i samband med rondan av ansvarig BM. Vid nytillkomna uppgifter eller symtom ställningstagande till behov av ändrad grad av observation och/eller ny riskbedömning.

Riskbedömningen noteras i journalen i text under sökordet ”riskbedömning”. Vid risk anges även orsak. En notering om klassificering görs också på beläggningslistan i Obstetrix.

Vid rondan stäms riskklassificeringen av.

Lågrisk Pat bör uppmanas gå på tidig hemgång.

- Tidigare frisk kvinna med okomplicerad graviditet.
- Okomplicerad förlossning, enkelbörd efter v 37.
- Kan hemskrivas av BM utan kontakt med läkare.

Medelrisk Individuell bedömning av rondande läkare med journalgenomgång minst en gång under vårdtiden. Bedöm behov av läkarutskrivning.

Psykosocialt

- Förlossningsrädsla
- Komplicerad social situation
- Ålder < 18
- Icke svensktalande
- Tidigare missbruk

Interkurrenta sjukdomar

- Lätt preeklampsi
- Hypertoni
- Diabetes mellitus
- Thyroideasjukdom
- Hjärtkärlsjukdom
- Psykisk sjukdom
- Njursjukdom
- Tarmsjukdom
- Annan systemsjukdom
- Anemi
- Smittbärare
- Flera riskfaktorer för trombosjukdom

Graviditet och förlossning

- Placentalösning
- Misstanke om ofullständig placenta
- Blödning >1000 ml
- Okomplicerat sectio
- Sfinkterskada/stor bristning
- Instrumentell förlossning
- Prematurförlossning
- Feber under/efter förlossningen
- Postpartuminfektion
- Urinretention
- Immobilisering

Högrisk Daglig klinisk värdering och journalanteckning av rondande BB-läkare.

- Vid en kombination av flera gula faktorer enligt individuell bedömning på rond
- HELLP
- Svår preeklampsi/ svårreglerat blodtryck
- Hjärtfel hos mor
- Komplicerat sectio
- Svår interkurrent sjukdom
- Pågående behandling för djup depression
- Tidigare postpartumpsykos
- Större blödning med misstänkt koagulationsrubbning
- Svår infektion postpartum