

# STI för primärvården

Faktautbildning 20170926  
Malin Assarsson, ST-läkare


# STI = sexually transmitted infections

—————> man kan bära på dem under  
lång tid utan symtom

# UVI eller STI?

--våga fråga!--

# Provtagning klamydia/gonorré



# Provtagning

- Klamydia/gonorré
  - Kvinnor:
    - Självprov: Roterar pinnen mot vaginalväggen under 3-5 sekunder och placera i "klamydia kit"-rör
    - Cervixprov: Rengör portio med bomullstork. Roterar provtagnings-pinnen under 3-5 sekunder i cervixkanalen och placera i "klamydia kit"-rör
  - Män:
    - Första portionen urin till "klamydia kit"-rör så att vätskeytan hamnar mellan markeringarna. Man bör ej ha kissat 1 timme före provtagning.

# Behandling klamydia

- Doxycyclin (Doxyferm) 100 mg – 2 tabletter dag 1 och därefter 1 tablett följande 8 dagar
- Provtagning och behandling är gratis
- Fast partner behandlas oavsett provsvar men ska lämna prov först
- Anmäles enligt SML. Remiss till kurator på hud för smittspårning
- Gonorrhé behandlas via STI-mottagningen

# Mycoplasma genitalium

- Riktad provtagning efter klinisk misstanke
- Provtagning:
  - Män: Första urinportionen 5-10 ml i skruvkorksrör
  - Kvinnor: Vaginal/cervixprov i skruvkorksrör med 2 ml NaCl
- Tilltagande antibiotikaresistens
- Begränsat antibiotikautbud
- Behandling enbart vid symtomgivande infektion:
  - Azitromycin (Azitromax) 250 mg 2x1 första dagen därefter 1x1 i 4 dagar

# Kondylom

- Humant papillomvirus (HPV)
- Hög grad av spontanläkning
- Varierande grad av smittsamhet –störst vid aktiv, färsk infektion och vid destruktion/behandling
- Varierande inkubationstid
- Stor psykosexuell dimension



# Kondylom - terapiindikation

- Avlägsna störande vårtor
- Lindra symtom
  - Dyspareuni
  - Klåda (tillväxt)
  - Blödning (ffa spetsiga)
- Minska smittspridning

# Kondylom - terapi

- Primärvård
  - Rök- och rakstopp!
  - Podofyllotoxin (Wartec/Condyline)
  - Imiquimode (Aldara)
- STI-mott
  - Kryo
  - Etsning
  - Curettage/diatermi
  - (Kirurgi/koldioxidlaser)

# Kondylom - terapi

- Podofyllotoxin
  - Wartec ®, kräm 0,15%
  - Wartec ®, kutan lösning, 5 mg/ml
  - Condyline ®, kutan lösning, 5 mg/ml
- Pensla vårtområdet morgon och kväll i 3 dagar. Låt torka. 4 dagars uppehåll. Upprepa.
- Utläkning: 50-80%
- Recidiv: 10-40%
- Kontraindicerat vid graviditet!

# Kondylom - terapi

- Imikvimod
  - Aldara®, kräm 5%
- Appliceras 3 gånger/vecka i max 16 veckor
- Biverkningar (ca 70%):
  - Erytem och irritation i virusinfekterad hud
  - Adenopati
  - Influensaliknande symtom
- Utläkning: 60-80%
- Recidiv: 30%

# Behandling - terapi

- Kryo
  - 90% utläkning, 30% recidiv
- Diatermi/kirurgi/koldioxidlaser
  - nästan 100% utläkning, 30% recidiv
- Biverkningar: Smärtsamt. Risk för ärrbildning.

# Allt är inte kondylom

# Frågor?