

## PM akutmottagning - bröstsmärta. Jönköping

**Åtgärder för alla patienter som har eller har haft bröstsmärta senaste 12 timmarna.**

Patient anländer via

1. Ambulans (ambulans-EKG inte sänt av någon anledning).
2. Annan transport.
3. Gående.

Patienter som kommer via receptionen – sök personal via ”bröstsmärtsökare”, kl. 07:00–21:30 sökare **294 21**. Övrig tid kontakta tjänstgörande sköterska på medicinsidan.

Alla patienter som söker med bröstsmärta, eller får bröstsmärta/andnöd på akutmottagningen ska tas omhand skyndsamt och EKG tas utan tidsfördröjning.

Medicinjour handlägger EKG som faxats från vårdcentral till akutmottagningen. Vid ny ST-höjning/grenblock tas kontakt med hjärtjour och handläggs enligt PM.

Sjuksköterska bedömer patientens EKG och allmäntillstånd enligt följande:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - ST-höjning                                   | - Smärtutstrålning |
| - Nyttillkommet eller tidigare okänt grenblock | - Andnöd           |
| - ST-sänkning                                  | - Blek             |
| - Bradykard/takykard                           | - Kladdig          |
| - Rytmi  | - Påverkad         |
| - Pågående smärta                              |                    |

Vid EKG-förändringar enligt ovan eller oklarheter tillkallas **omedelbart** medicinjour, sökare **291 97**.

Akutmottagningens personal:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - ID-märk patienten        | - Patienten ska ha två venösa           |
| - EKG-övervakning          | infarter varav minst en av              |
| - Blodtryck och saturation | storlek 18G (grön PVK). Nål             |
| - Smärtlindring            | sätts <b>inte</b> i höger underarm nära |
| - Syrgas.                  | handled.                                |
| - Blodprov enligt rutin.   |   |

**Dessa förberedelser avbryts vid beslut om akut PCI.**

Förbered patienten för transport till HIA, coronar-labb eller MAVA. Avvakta beslut från medicin-/hjärtjour.

**Vid indikation för PCI – se baksida för handläggning.**

## Genomgång av checklista för akut PCI, akutmottagningen i Jönköping.

Indikation för reperfusionsbehandling, båda frågorna måste besvaras med JA.

- |  | Ja                       | Nej                      |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1 Symtom</b> som inger stark misstanke om <b>pågående</b> hjärtinfarkt<br>Symtomdebut (datum): ..... kl: .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2 EKG-förändringar</b><br>- ST-höjningar $\geq 2$ mm i minst två bröstavledningar,<br>eller<br>- $\geq 1$ mm i minst två extremitetsavledningar<br>eller<br>- nytillkommen, tidigare okänd eller förändrad grenblocksbild | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Anamnesuppgifter

- |   | Ja                       | Nej                      |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>3 Annan svår sjukdom?</b>                        |                          |                          |
| Grav demens   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Metastaserande malign sjukdom                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biologiskt åldrad patient och/eller särskilt boende | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Om fråga 1 - 2 besvarats med "ja" tas kontakt med hjärtjour, **minicall 0746-21 64 40 eller sökare 219 53**, som ger direktiv om fortsatt handläggning.

Om fråga 1 - 2 besvarats med "nej" handläggs patienten enligt riktlinjer.

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>4 Hemostasanamnes</b>                         |                          |                          |
| ASA-överkänslighet                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Waran <sup>®</sup> /Marcumar <sup>®</sup> /NOAK* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5 Tidigare revaskularisering?</b>             |                          |                          |
| Bypassopererad (CABG)                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PCI (ballongvidgning)                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vid transport till HIA/PCI-labb ska patienten EKG-övervakas, ta med defibrillator, Leardalblåsa och svalgtub.

\* NOAK = Pradaxa<sup>®</sup>, Eliquis<sup>®</sup>, Xarelto<sup>®</sup>