

National Early Warning Score 2 (NEWS2)

Fysiologiska parametrar	3	2	1	0	1	2	3
Andningsfrekvens	≤8		9–11	12–20		21–24	≥25
Syremättnad 1	≤91	92–93	94–95	≥96			
Syremättnad 2 (används på läkarordination*)	≤83	84–85	86–87	88–92	93–94 med syrgas	95–96 med syrgas	≥97 med syrgas
Tillförd syrgas		Ja		Nej			
Systoliskt blodtryck	≤90	91–100	101–110	111–219			≥220
Puls/hjärtfrekvens	≤40		41–50	51–90	91–110	111–130	≥131
Medvetandegrad**				Alert			CVPU
Temperatur	≤35,0		35,1–36,0	36,1–38,0	38,1–39,0	≥39,1	

* Syremättnad 2 används på patient med högt habituell pCO₂ (=tillvanda till kroniskt förhöjt pCO₂ pga kronisk respiratorisk svikt, t ex grav KOL)

** Medvetandegrad: A=alert, C=confusion (nyttillkommen eller förvärrad förvirring), V=voice (reagerar med ögonöppning, tal eller rörelse vid tilltal/kraftiga tillrop), P=pain (reagerar vid smärtstimulering), U=unresponsive (reagerar ej vid tilltal/smärtstimulering)

Kontroller och åtgärder

Kontroller kan avslutas efter två dygn om patient har 0 poäng. Dessutom utförs en kontroll inför utskrivning.

Poäng	Ny kontroll	Åtgärd
0	Inom 8-12 tim	Infekterade och bukopererade patienter var 8:e tim, övriga var 12:e tim
Totalt 1-4 Låg risk	Inom 4-6 tim	<ul style="list-style-type: none"> • Informera ansvarig sjuksköterska om NEWS-värdet • Ansvarig ssk bestämmer kontrollintervall och om läkarbedömning behövs
Någon 3-poängare	Inom 1 tim	Se nedan 5-6 poäng
Totalt 5-6 Medium risk <i>Brådskande åtgärder</i>	Inom 1 tim	<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarig sjuksköterska ska omedelbart informera ansvarig läkare • Brådskande bedömning av läkare* (<i>misstänk alltid sepsis som orsak**</i>) • Överväg vård med möjlighet till tät tillsyn och övervakning • Överväg IVA/MIG-konsultation • Kontrollintervall beslutas av ansvarig läkare efter bedömning
7 eller mer Hög risk! <i>Akuta åtgärder</i>	Täta kontroller eller kontinuerlig övervakning	<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarig sjuksköterska ska tillkalla läkare för omedelbar bedömning* • Ansvarig läkare ska/bör vanligtvis konsultera IVA-kompetens (IVA-läkare/MIG) • Överväg att flytta patient till högre vårdnivå • Kontrollintervall beslutas av ansvarig läkare efter bedömning

NEWS är bara ett stöd i bedömning av patienter! Vid allvarig oro över patientens tillstånd trots låga poäng, -kontakta läkare.

*Vid problem med bedömning av ansvarig läkare kan sjuksköterska själv kontakta bakjour eller IVA-läkare.

**Vid NEWS ≥ 5 på patient med misstänkt eller bekräftad infektion, tänk "Är detta sepsis?" Använd sepsiskort och vidta snabba åtgärder.

Låg urinproduktion	Om urinmängd mäts och är mindre än 200 ml på 8 tim: Ta kreatin, informera ansvarig läkare
--------------------	---

Sektion Chefläkare och patientsäkerhet