

Uppstartsschema **3**, sondmatning i jejunum/ventrikeln

Används om patienten har en jejunumsond eller har en ventrikelsond efter en stor operation i magtarmkanalen.

- Räkna ut aktuellt energi- och vätskebehov. Bedöm därefter lämplig mängd och sort sondnäring så att energibehovet tillgodoses senast efter dag 3.
- Förstahandsval av sondnäring vid upptrappning är **Isosource Protein Fibre**.
- Ge minst 50 ml vatten innan och efter varje sondmatsförpackning.
- Tillförselhastigheten anpassas efter tolerans. Vid toleransproblem, backa ett steg i schemat.
- **Maximal tillförselhastighet vid matning i jejunum är 125 ml/h.**
- **Kontakta dietist** vid eventuellt problem under upptrappning alternativt vid behov av individuell bedömning. Om dietist ska skriva ut sondnäring inför hemgång bör kontakt tas i god tid.

	Mängd (ml)	Hastighet (ml/h)	Tillförseltid (h)	Energimängd (kcal)	Parenteralt nutritionsstöd
Dag 1	500	25	20	650	Enligt ordination
Dag 2	1000	50	20	1300	Enligt ordination
Dag 3	1500	75	20	1950	Enligt ordination
Dag 4		100		Patientens energibehov	Enligt ordination
Dag 5		125		Patientens energibehov	Enligt ordination