

Ordination enligt generella direktiv:

Vaccination mot influensa och pneumokocker för patienter listade på vårdcentralen samt för personal

Gäller vaccination som utförs av hemsjukvården inom särskilt och ordinärt boende.

Undvik att vaccinera patienter med en pågående infektion/feber.

Indikationer för influensavaccination

- Personer ≥ 65 år
- Gravida efter graviditetsvecka 16 (gravid och annan riskgrupp, även före vecka 16)
- Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 - kronisk lever- eller njursvikt
 - diabetes mellitus
 - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
- Hushållskontakter och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Vårdpersonal och omvårdnadselever med patientkontakter

Vid Waranbehandling (eller motsvarande) ges injektionen djupt subcutant

Kontraindikation för influensavaccination

- Äggallergi, i övrigt se FASS

Dosering

0,5 ml ges intramuskulärt i musculus deltoideus alternativt djupt subcutant.

*Barn 6 månader till < 9 år: Grundvaccination två doser 0,5 ml med minst 4 veckors intervall om barnet inte tidigare vaccinerats mot säsongsinfluensa. Vid årlig revaccination endast en dos.

Fluenz: Se FASS

Tillfällen

Vaccinet ges i engångsdos.

Indikationer för pneumokockvaccination

- Personer ≥ 65 år
- Personer med kroniska sjukdomar
 - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
 - instabil diabetes mellitus
 - kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 - kronisk lever- eller njursvikt

Kontraindikation för pneumokockvaccination

Akut infektion med feber.

Dosering

0,5 ml ges intramuskulärt i musculus deltoideus alternativt djupt subcutant.

Tillfällen

Vaccinet ges som engångsdos. Endast en gång i livet rekommenderas.

Dokumentation

Dokumentation görs i Svevac.

Enhet

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Medicinskt ansvarig läkare

Aktuell författning:

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. 6 kap 6 §