

Ordination enligt generella direktiv:**Åtgärder vid överkänslighetsreaktion hos vuxna och barn i samband med influensa- och/eller pneumokockvaccination**

Gäller för sjuksköterskor som vaccinerar på mottagningar, avdelningar, i hemsjukvård inom särskilt eller ordinärt boende.

Till vaccinationslokalen ska följande medtagas:

- Adrenalinpenna 0,3 mg + 0,15 mg eller Inj Adrenalin 1 mg/ml, 2 st
- T Betapred 0,5 mg, 30 st
- Inj Betapred 4 mg/ml, 2 st
- Blodtrycksmanschett
- Stetoskop
- Utrustning för perifer venkateter
- Mobiltelefon – telefonnummer till läkare på vårdcentralen/jourcentralen

Anafylaktisk reaktion med påverkad cirkulation ska behandlas med adrenalin (Adrenalinpenna eller inj Adrenalin i.m.). Sätt venös infart om möjligt. Höj benen. Larma ambulans, 112.

Ordination vuxna och barn från 5 år eller > ca 20 kg:

1. Adrenalin: Adrenalinpenna 0,3 mg im eller inj. Adrenalin 1 mg/ml 0,3-0,5 ml i.m.
2. Kortison: T Betapred 0,5 mg 10 tabletter eller inj Betapred 4 mg/ml: 2 ml (8mg) intravenöst

Ordination barn 0-4 år eller < ca 20 kg

1. Adrenalin: Adrenalinpenna 0,15 mg im eller inj. Adrenalin 1 mg/ml i.m. (Obs! 0,01 ml/kg max 0,5 ml)
2. Kortison: T Betapred 0,5 mg: 8 tabletter eller inj Betapred 4 mg/ml: 1 ml (4 mg) intravenöst

Enhet

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Medicinskt ansvarig läkare

Aktuell författning:

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. 6 kap 6 §