

Ordination enligt generella direktiv:

För vaccination mot influensa samt vaccination mot pneumokocker

Gäller för sjuksköterskor som vaccinerar på mottagningar och avdelningar inom Region Jönköpings län.

Undvik att vaccinera patienter med en pågående infektion/feber.

Indikationer för influensavaccination

- Personer ≥ 65 år
- Gravida efter graviditetsvecka 16 (gravid och annan riskgrupp, även före vecka 16)
- Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 - kronisk lever- eller njursvikt
 - diabetes mellitus
 - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
- Hushållskontakter och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Vårdpersonal och omvårdnadselever med patientkontakter

Vid Waranbehandling (eller motsvarande) ges injektionen djupt subcutant

Kontraindikation för influensavaccination

- Äggallergi, i övrigt se FASS

Dosering

0,5 ml ges intramuskulärt i musculus deltoideus alternativt djupt subcutant.

*Barn 6 månader till < 9 år: Grundvaccination två doser 0,5 ml med minst 4 veckors intervall om barnet inte tidigare vaccinerats mot säsongsinfluensa. Vid årlig revaccination endast en dos.

Fluenz: Se FASS

Tillfällen

Vaccinet ges i engångsdos.

Indikationer för pneumokockvaccination

- Personer ≥ 65 år
- Personer med kroniska sjukdomar
 - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
 - instabil diabetes mellitus
 - kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 - kronisk lever- eller njursvikt

Kontraindikation för pneumokockvaccination

Akut infektion med feber.

Dosering

0,5 ml ges intramuskulärt i musculus deltoideus alternativt djupt subcutant.

Tillfällen

Vaccinet ges som engångsdos. Endast en gång i livet rekommenderas.

Dokumentation

Dokumentation görs i Svevac.

Enhet

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Medicinskt ansvarig läkare

Aktuell författning:

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. 6 kap 6 §